

## **O-A6**

### **IMPACTO DEL PROFESIONAL SANITARIO SOBRE LAS TASAS DE LACTANCIA MATERNA EN UN CENTRO DE SALUD**

Antonia María Carmona Gallardo <sup>(1)</sup>, Rocío Mateo Ciria <sup>(1)</sup>, Jesús Bravo Rodríguez <sup>(1)</sup>, Arantxa Cubero Muñoz <sup>(1)</sup>, Pilar Medina Adán <sup>(2)</sup>, Natalia Portero Fidalgo <sup>(1)</sup>, Pilar Rebollo Blanco <sup>(1)</sup>, José Antonio Ferrús Ciriza <sup>(1)</sup>, Concepción Gómez Deyros <sup>(1)</sup>, Angel González Requejo <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Centro de Salud Santa Mónica, Rivas-Vaciamadrid, Madrid; <sup>(2)</sup> Hospital Universitario de Getafe, Getafe.

La promoción y el apoyo a la lactancia materna por parte de los profesionales sanitarios es una estrategia eficaz para mejorar las tasas de lactancia materna en una comunidad, aunque desconocemos en que medida el perfil del profesional tiene un impacto en las tasas de LM de la población asignada.

Dentro del proyecto CS-IHAN del Centro de Salud Santa Mónica y en el estudio inicial de prevalencia de LM de la fase 2D recogimos, junto a los datos de la encuesta, los profesionales de pediatría y de enfermería pediátrica que tenía asignado cada niño. Nuestro centro contaba en el momento de realizarse el estudio estadístico con 5 profesionales de pediatra (que denominaremos A, B, C, D y E) y 3 profesionales de enfermería pediátrica (I, II, III) que atendían una población de 976 lactantes menores de 2 años. El tamaño final de la muestra obtenida para el estudio fue de 129, lo que nos ha permitido comparar algunas tasas de LM por profesional. Para la presente comunicación, nos hemos centrado en los datos obtenidos en los lactantes menores de 6 meses donde la LM aporta mayores beneficios.

Las tasas de prevalencia de LM de los profesionales sanitarios mostraron diferencias muy notables entre ellos. Con respecto a los profesionales de pediatría, se perfilaron claramente 2 grupos: A, B y C tuvieron tasas de LM exclusiva en menores de 6 meses superiores al 60 % (60, 66,7 y 75 % respectivamente) mientras que en los profesionales D y E quedaron por debajo del 30 % (29,4 y 25 %). Los profesionales de enfermería mostraron asimismo resultados muy dispares, con el profesional I con una tasa elevada de LM (69,2 %), muy alejada de la del profesional III (23,1 %), El profesional II obtuvo una tasa de LM intermedia (46,2 %), muy similar a la media de la muestra total para este grupo de edad.

De nuestros datos parece deducirse que la actitud del profesional sanitario con respecto a la LM en nuestro medio tendría un fuerte impacto en la consecución de mejores resultados en lactancia natural en los primeros meses de vida.