

Generalidades sobre el VIH y la Alimentación del lactante

Al concluir esta sesión los participantes serán capaces de:

- Explicar el riesgo de la transmisión del VIH de la madre al niño
- Describir los factores que influyen en la transmisión de la madre al niño
- Delinear enfoques que puedan prevenir la transmisión de la madre al niño mediante prácticas seguras de alimentación
- Establecer las recomendaciones sobre alimentación infantil, para mujeres VIH positivas y para mujeres VIH negativas o con el estado de VIH desconocido

Definiendo el VIH y el SIDA

VIH

- Es el virus de la Inmunodeficiencia Humana, que causa el SIDA

SIDA

- Es el Síndrome de la Inmunodeficiencia Humana; es la condición patológica activa que sigue al estado temprano, no sintomático, de la persona que es VIH positiva

La transmisión del VIH de la madre al niño

Los niños pequeños con VIH usualmente adquieren la infección de sus madres


- Durante el embarazo, a través de la placenta
- En el parto y nacimiento, mediante la sangre y secreciones
- Mediante la lactancia materna

Esto es conocido como transmisión del VIH de la madre al niño, transmisión del VIH de la madre al hijo o transmisión vertical del VIH


Riesgo estimado y momento de la transmisión del VIH de la madre al niño, en ausencia de intervenciones

<u>Momento de la transmisión</u>	<u>Porcentaje de transmisión</u>
•Durante el embarazo	5-10%
•Durante el parto y nacimiento	10-15%
•Durante la lactancia materna	5-20%
<hr/>	
•Total sin lactancia materna	15-25%
•Total con lactancia materna hasta los 6 meses	20-35%
•Total con lactancia materna hasta los 18–24 meses	30-45%


100 madres y bebés




1000 madres y bebés




100 madres y bebés



1000 madres y bebés




100 madres y bebés




1000 madres y bebés




100 madres y bebés




1000 madres y bebés



100 madres y bebés




1000 madres y bebés




20 bebés



20 bebés



20 bebés



Factores que influyen en la transmisión del VIH de la madre al niño

- Infección reciente por VIH
- Gravedad de la enfermedad
- Infecciones por enfermedades de transmisión sexual
- Procedimientos obstétricos
- Duración de la lactancia materna
- Lactancia materna exclusiva o alimentación mixta
- Condición de los pechos
- Condición de la boca del bebé

Políticas de apoyo a la lactancia materna

“Como un principio general, en todas las poblaciones, e independientemente de las tasas de infección por VIH, debe continuarse protegiendo, promoviendo y apoyando la lactancia materna.”

VIH y Alimentación Infantil: una declaración conjunta sobre políticas desarrolladas por ONUSIDA, OMS y UNICEF, 1997.

Recomendaciones sobre la alimentación infantil para madres VIH positivas

- Cuando la alimentación de sustitución es aceptable, factible, accesible, sostenible y segura, es recomendable evitar del todo que la madre infectada brinde lactancia materna
- Si esto no ocurre, la lactancia materna exclusiva es recomendable durante los primeros meses de vida